

***Centro de investigación y desarrollo Victoria.  
Manchester-Sheffield.***

# *ACTINOS-Mentira en una botella*

*Dr. Victor Blackheart.  
Dr. Lucius Stormrider.  
Dr. Beatrice Copperbane  
Dr. Elara Stormforge.  
Dr. Alistair Brightspark*

**Introducción.** Es bien conocido que las capacidades mutagénicas y alterantes que producen los consumibles de la marca Actinos! son bastante llamativas gracias a las habilidades que otorgan sus compuestos. Sin embargo, en las últimas fechas, se tienen estimas de sintomatologías más variadas y constantes que enlazan un consumo excesivo y mayor comparado con las últimas décadas en todo Reino Unido, donde se desglosara esta cuestión a lo largo de este formato.

*I. Los Actinos! son formulas hechas a base de cadenas poli-proteínicas que utilizan como base en su estructura distintos tipos de microfilamentos de nombres Actina (de ahí el nombre) y Miosina, esenciales para las contracciones musculares y recubrimientos celulares para los miocitos del sistema musculo esquelético, donde estas cadenas actúan de manera instantánea en el cuerpo al momento de ser ingerido para generar diversas habilidades, acelerando el metabolismo y alterando la homeostasis humana de forma que agrega 17 fases extras*

en el que ocurren cambios drásticos en la morfología de los músculos, añadiendo habilidades excepcionales a los sujetos expuestos al Actino.

II. Sin embargo, se ha descubierto a través de varios sujetos de prueba y actualmente 243 pacientes; una malformación y atrofia muscular a lo largo de sus manos, brazos, rostro, tórax y diafragma; relacionados directamente como efecto secundario a largo plazo por una alta concentración de proteínas residuales conocidas como crioglobulinas alfa las cuales se acumulan y forman grandes coágulos de material toxico que induce estos cambios; lamentablemente, también induce una terrible adicción a estos compuestos y a la necesidad de poder en los afectados.




**III.** *Gracias a esto, se determinaron 3 fases que rodean el ciclo de adición a los Actinos, siendo la primer fase un uso continuo de los mismos, llegando a usar tres o más veces estos productos en un periodo de menos de 20 horas.*

- IV. Entre los síntomas iniciales de esta condición se pueden encontrar: dependencia a los Actinos, ronchas o manchas moradas en los brazos, cambios drásticos de humor, dolor muscular y dolor articular.
- V. La segunda fase en la sintomatología de esta condición ya encontramos con cambios drásticos en la fisiología de los afectados, encontrando los síntomas antes mencionados y además: malformaciones leves en el rostro, pústulas purulentas y a menudo sangrantes, hematomas más grandes, venas hinchadas y periodos cortos de psicosis violenta. Donde el paciente generalmente tratará de esconder su condición y tratará de aislarla social y mentalmente. Esta segunda fase ocurre después un transcurso de meses de usar ininterrumpidamente los Actinos. Aunque por supuesto, la evolución de la enfermedad puede variar dependiendo de la condición física del paciente, las dosis que consuma, su genética y varios factores más.
- VI. En la tercera y última fase de la enfermedad, las malformaciones ahora se extenderán a todo el cuerpo, causando amasijos de tejido en el rostro, deformación del sistema óseo y grandes problemas neurológicos y cognitivos que desencadenan fuertes alucinaciones, paranoia, conductas autodestructivas, agresión y psicosis que tarde y temprano mataran al afectado.

Es necesario tratar la regulación de los Actinos al mercado para evitar la posibilidad de que cientos, inclusive, miles de consumidores de este producto sean víctimas de este inevitable proceso y la imposibilidad de poder extraer o eliminar del organismo las Crioglobulinas.

A pesar de que los casos de esta índole son mínimos, se estima que en los próximos años van a aumentar los casos de adicción y malformaciones fisiológicas provocadas por los Actinos que inducirán a un aumento de la tasa de mortalidad en Reino unido sabiendo que el 86% de los habitantes consumen Actinos al menos una vez en la vida.



\* La probabilidad de muerte se encuentra en escala logarítmica.  
Fuente: elaboración propia con base en datos de Cáceres y Colunga, México 2000, 2001 y 2010.

También determinándose que los casos de violencia y ataques aumentara drásticamente en la ciudad de Manchester si no se trata esta situación.

Las investigaciones también encontraron que mientras más Actinos se consumen y los afectados atraviesan las distintas fases, se va desarrollando una especie de inmunidad a los efectos que otorgan los poderes de los mismos. Lo que suma más desesperación e incentivos para administrar más formula a sus organismos, lo que llega a acelerar el proceso de manera exponencial.

